

SITUACIÓN LABORAL EN PACIENTES CON AR

Aguerreberre MJ, Auad C, Gazze E, Gusis S, Sequeira G, Kerzberg E.
Servicio de Reumatología. Hospital J. M. Ramos Mejía.

Introducción: los pacientes con Artritis Reumatoidea (AR) experimentan una variedad de limitaciones funcionales asociadas al dolor, la fatiga y la inflamación articular. Un área importante en el funcionamiento social afectada por la AR es la capacidad para trabajar. El impacto subsecuente sobre el paciente, su familia y la capacidad para enfrentar la enfermedad deben ser motivo de estudio, mas aún cuando la desocupación y la subocupación es un problema que afecta a mas de 4.000.000 de personas en nuestro país.

Objetivos: analizar la situación laboral en pacientes con AR.

Materiales y métodos: se encuestaron pacientes ambulatorios del Consultorio externo de Reumatología del Hospital J. M. Ramos Mejía, aplicándose como método de evaluación de su situación laboral " la encuesta permanente de hogares" desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la Republica Argentina. Todos los pacientes cumplan con al menos 4 criterios de Colegio Americano de Reumatología (ACR). Como comparación se encuestaron pacientes del Consultorio externo de Clínica Médica a fin de lograr un grupo de similar sexo y edad. Los encuestados son definidos como desocupados si no han trabajado en la semana previa a la encuesta, pero buscan trabajo y no lo encuentran

Resultados: se encuestaron 108 pacientes con AR (con 6,87 años de evolución) y 81 controles. Los pacientes y los controles eran similares en edad, sexo, y estadio funcional. Los resultados se resumen en la tabla 1:

	AR	Controles	p
No trabajaron la ultima semana	64(59%)	36(45%)	0.04
Tenían trabajo	74(68,52%)	72(88,88%)	0.001
No trabajaron por su enfermedad	20(27.03%)	6 (8.33%)	0.003
Buscaron trabajo	8/38(21,05%)	15/26 (57,69%)	0.001
Desempleados	11(10.19%)	15 (18.52%)	0.09
Sueldo promedio	446,87\$	498,29\$	0.44

Conclusiones : los pacientes con AR corresponden a un grupo que incluye a una menor proporción de pacientes que trabajan y a una mayor proporción de personas que no tienen trabajo ni lo buscan. Por ello no hubo diferencias en los niveles de desempleo en los pacientes con AR vs los controles.

Entre los pacientes con AR que tenían trabajo pero no trabajaron esa semana la causa mas común de no haberlo hecho fue su enfermedad.

El sueldo promedio de los pacientes con AR que trabajan fue menor que los controles pero esa diferencia no fue estadísticamente significativa.