

## EVOLUCION DE UNA VASCULITIS HIPOCOMPLEMENTEMICA

Dres Mamani Marta\*, Romanini Félix E\*, Mónaco Antonio\*, Fonseca Leticia de\*

Dra Manzur María Elena\*\*

\* Sección Reumatología, \*\* Sección Dermatología Hospital Bernardino Rivadavia

En 1.973 Mc Duffie describió un síndrome al que designó vasculitis hipocomplementémica definido por la existencia de hipocomplementemia, vasculitis cutánea y artritis. Las características sobresalientes son la hipocomplementemia y la aparición de una lesión urticariana de 24-96 hs de duración que evoluciona con brotes recidivantes; por esta manifestación clínica forma parte también de las denominadas vasculitis urticarianas. La vasculitis hipocomplementémica a menudo indica una enfermedad subyacente potencialmente severa como LES, HUVS (síndrome de vasculitis urticariana hipocomplementémica), crioglobulinemia mixta y con menor frecuencia S.S. 1rio.

Caso clínico: paciente de sexo femenino de 34 años de edad que consulta en 1.999 por poliartralgias y oligoartritis de reciente comienzo, fenómeno de Raynaud y lesiones eritematosas en región malar. Posteriormente se agregan mialgias, debilidad muscular y edema bpalpebral.

Examen físico: artritis asimétrica de pequeñas articulaciones, tumefacción de partes blandas en ambas manos, artralgias de grandes articulaciones (rodillas, hombros), debilidad muscular, lesiones eritematosas en región malar, máculas de 0,5-1 cm de diámetro en MMSS y MMII con sensación de prurito y ardor en las mismas, edemas de ambos pies y signo de Köebner positivo.

Laboratorio: rutina normal; Látex (+), FAN (-), Anti Ro (+), Anti La (+), C3 (<), C4 (<), crioglobulinas (-), ANCA (-), C1q (-).

Biopsia de piel de MSD: vasculitis urticariana.

Biopsia de eritema malar: rosácea.

La paciente evoluciona con recidiva de sus lesiones cutáneas. En febrero de este año comienza con sensación de cuerpo extraño en ambos ojos, xerostomía y sequedad vaginal. Se investiga SS 1rio. obteniéndose biopsia de mucosa labial grado IV.

Comentarios: según la bibliografía consultada la vasculitis hipocomplementémica registra baja prevalencia en el SS 1rio., siendo más infrecuente aún como forma de presentación.