

Clínica para la detección de Espondiloartritis axial (EsPax)

**Grupo de Estudios
Espondilitis Anquilosante**

Espondilitis Anquilosante

Grupo de Estudios


INTRODUCCIÓN

- La lumbalgia crónica es un síntoma frecuente dentro de las Esp, principalmente de la Espondilitis Anquilosante (EA).
- Entre las causas de lumbalgia crónica 5% corresponden a EA.
- La prevalencia de EA? es entre 0.5-1% de la población general.

ALGORITMO DE BERLIN

VERSION MODIFICADA

- Presencia de otras características de EsP**
- Entesitis Aquiliana
 - Dactilitis
 - Uveítis
 - Historia familiar positiva
 - Enfermedad de Crohn
 - Dolor glúteo alternante
 - Psoriasis
 - Artritis asimétrica
 - Respuesta positiva a AINE
 - reactantes de fase aguda elevados (PCR, VSG)



Derivación

AP
Clínica
Traumatología
Otros

Realización de
clases, charlas,
cartelería

CONSULTORIO DE LUMBALGIAS

TARJETA DE DERIVACIÓN
(fecha: ___/___/201___)
Apellido y Nombre: _____
Edad: _____
Sexo: _____

Médico que deriva (marcar con X)

Clínico
 Generalista/Med Fliar
 Traumatólogo
 Otro

Tiempo de evolución de lumbalgia (meses) _____
Edad de inicio de lumbalgia (años) _____

EsP ax nr
Esp ax r (EA)

FICHA

ALGORITMO
DE BERLIN
MODIFICADO

No EsP



RESULTADOS

ΚΕΣΟΓΙΑΔΟΣ


RESULTADOS

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Htal Sr Milagro Salta	10	16,1	16,4	16,4
	Htal Gutierrez LP	20	32,3	32,8	49,2
	OSECAC BA	3	4,8	4,9	54,1
	IREP	28	45,2	45,9	100,0
	Total	61	98,4	100,0	
Perdidos	Sistema	1	1,6		
Total		62	100,0		

CENTROCODIF*Dxreumatologico tabulación cruzada

Recuento

		Dxreumatologico			Total
		EsP ax nr	EA	No EsP	
CENTROCODIF	Htal Sr Milagro Salta	0	0	4	4
	Htal Gutierrez LP	7	9	4	20
	OSECAC BA	0	0	1	1
	IREP	0	0	22	22
Total		7	9	31	47



Lumbalgia ≥ 3 meses
Inicio ≤ 45 años

Radiografías

+

6.5%
(4)

EA

-

51.6%
(32)

4.8%
(3)

≥ 4

12.9%
(8)

EsPax-nr

Caract EsP

2-3

19.4%
(12)

HLAB27

+

8.1%
(5)

-

11.3%
(7)

IRM

+

0-1

27.4%
(17)

HLAB27

+


-

27.4%
(17)

Otro Dx

19.4%
(12)

DIAGNÓSTICOS



REFORMULAR EL CONSULTORIO DE LUMBALGIAS

CRITERIO DE INCLUSIÓN

Inicio antes de los 45 años y 3 meses de evolución



UN CRITERIO DE LUMBALGIA INFLAMATORIA

CALIN

BERLIN

ASAS


EA



FERGUSON Y/O
PANORÁMICA DE
PELVIS



Ingresa al
algoritmo





MUCHAS GRACIAS

MUCHAS GRACIAS

CONTACTO

emilio.buschiazzo@gmail.com